

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷

四十二

詳校官太醫院見羅臣表天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄錄監生臣陳元熙

欽定四庫全書

普濟方卷四十

明周王朱橚撰

大臟腑門

大便不禁

論

夫大腸為傳導之官掌化糟粕魄門為之候若其臟寒氣虛不能收斂致糟粕無所制約故遺失不時治之宜澀故津液方論所謂澀可去脫是也

方

陳橘丸

治大便不禁腹內疔痛

陳橘末

炒

白茯苓

去黑皮

黃連

去鬚炒

黃柏

去粗皮炙

乾薑

炮

附子

去皮臍

龍骨

各一兩

赤石脂

甘草

炙

人參

當歸

切焙各一兩

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五六丸空心米飲

下日再服

救陽丸 治大便不禁手足厥冷面色青白

吳茱萸

湯浸焙乾

乾薑

炮

赤石脂

蜀椒

炒出汗

硫黃

飛研

右等分為末稀糊為丸梧桐子大每服十五丸米飲下空心食前漸加丸數鹽湯亦得

龍骨湯 治大便秘真氣羸弱

龍骨

阿膠

炙燥

乾薑

炮

黃連

去鬚

炒

粳米

三合

附

子

炮去皮臍

甘草

炙判

黃芩

去黑心

芍藥

各三分

石榴

一枚

大

者切另

入搗

右咬咀每服五錢水盞半煎一盞去滓空心溫服

日再

地榆丸 治大便秘

地榆

一兩

白龍骨

赤石脂

沒石子

熟艾

去梗炒

橡實殼

炒各半兩

黃栢

去粗皮炙三分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服三十丸空心米飲下

日再

附子湯 治下焦虛寒大便秘

附子

炮去皮臍半兩

黃連

去須炒二兩

阿膠

炙燥三分

甘草

炙

乾薑

炮各半兩

赤石脂

厚朴

去粗皮薑汁炙各一兩

右咬咀每服五錢水盞半煎一盞去滓空心溫服日再

石榴皮湯 治虛寒客於下焦腸滑洞洩困極欲死

酸石榴皮

炒

乾薑

炮各一兩

黃栢

去粗皮炙

阿膠

炙燥各三分

右咬咀每服四錢水一盞煎四分去滓空心溫服或無黃栢用黃連亦得

厚朴荳蔻湯 治大便秘

肉豆蔻

去殼炮半兩

龍骨

白朮

剉炒三分

厚朴

去粗皮薑汁炙判一

兩

右咬咀每服五錢水盪半生薑三片煎一盞去滓空
心溫服

朝真丸 治虛損洩瀉大便失禁

硫黃

一兩
研飛

青鹽

一錢
研

晉礬

熬枯
一兩
研

右研勻水浸炊餅丸菴豆大每服十五丸至二十丸
溫酒下空心食前或用丹砂為衣亦得

福建丸 治大便秘并腸鳴

附子

去皮臍
剉一兩

厚朴

去麤皮二兩同附子用生薑汁浸一宿於瓦器內炒

右為末用酒煮陳橘末為糊丸梧桐子大每服十五丸至二十丸生薑鹽湯下空心食前服

石硫黃湯 治虛冷大便不禁氣脫神昏

石硫黃

明者
細研

紫筍茶

焙乾研末
各一兩

右水一盞下硫黃末半錢七茶一錢七煎六分去滓溫服不拘時日三

大理中丸

出危氏方

治大便虛滑不禁每一丸用平胃散一

貼煎化服便止加鹽梅煎尤妙

人參 白朮 乾薑 甘草

各等分

右為末煉蜜丸如指頭大

脫肛論

夫肛門者主大行道肺大腸候也號為通事今史重十二兩長一尺三寸廣二寸三分應十二時若臟腸熱則肛門閉塞大行不通或腫縮入生瘡若臟腑寒則肛門開大行洞瀉肛門凸出良久乃入熱則通之寒則補之

虛實和平依經調理之○四十八難曰病之虛實出者為虛入者為實肛門之脫虛也蓋實則溫溫則內氣充而有所蓄虛則寒寒則內氣餒而不能收而況大腸之厚薄膏脂之肥瘠亦視夫內氣之虛耳大凡肛脫須以溫湯洗令和軟然後摩掌而入治法以治斂行之其有產婦用力過多及小兒叫號努氣久痢不止風邪所襲亦有此證凡腸頭作癢即是中有蟲生取苦楝根煎湯薰洗仍以乾艾生薑煎服其脫肛腸風痔瘻者登溷

不可用舊紙若包裹湯藥雜物尤不可用纔有一毫染
汚其間立見痛腫如此急以溫湯滌之患在肛腸登溷
後須用一洗○下痢脫肛者因大腸虛弱冷氣僵之至
圖不能便極力於下肛門脫出故謂之脫肛溫其臟則
愈古方有坐湯溫熨之藥皆良法也脫肛一證氣聚不
散也裏急而不得出外脹而不得入先以枳殼散作劑
又以枳殼燒灰存性細末摻傅或津唾調傅氣散則腫
消矣仍用生薑汁調五苓散如膏入新水研散略煎吞

黃連阿膠丸此論肛門挾熱而腫脹也其或腸中虛薄不收則理中湯釣腸丸養臟湯輩主之烏鰂骨木賊草傳之

方

猪膽散

出千金方

治大腸寒應肛門寒則洞洩肛門滯出

猪膽

一斤熬令燥

黃連

阿膠

芎藭

各二兩

烏梅肉

五兩

艾葉

一兩

右為末每服二錢溫酒調下白米飲亦可食前日再服

金鳳膏 治痔瘡破者脫肛

鮮魚肝

一個

龍腦

錢一

麝香

錢半

飛礬

錢半

黃連末

些炒

加少

右為末用鮮魚膽調塗五六次立効

鯨甲丸

出聖惠方

治脫肛皆因久痢大腸虛冷所致肛門

為大腸之候大腸傷於寒下痢用力其氣不逆則肛門脫出雖一年下痢脫肛門不收腹中冷可安

鯨甲

醋炙一方用鯨頭

蝟皮

炙

桂心

兩各一

磁石

二兩醋淬

煨

右為細末蜜丸菜豆大米飲下五丸量大小加減服

一方為散食前粥飲服

治脫肛

神効方

蔓陀羅花子

蓮殼

一對

橡碗

十六個

右搗碎水煎三五沸入朴硝熟洗其肛自上

香膽丸

方見痔瘻門諸痔類

治痔漏脫肛

荊芥散

出血指方

治脫肛

大香附

荊芥穗

各半兩

縮砂

二錢半

右為末每服三錢食前新水煎數沸即服小兒通用

一方無縮砂洗

縮砂湯

出指直方

治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂

黃連

木賊

各等分

右為末每服二錢米飲調下

治大腸虛冷大便後脫肛洞出

出聖惠方

驚頭

一枚塗酥炙令焦

鐵精

一兩研

葇蓉子

一兩水淘去浮者水浸毛出候

乾炒

右為末每服二錢食前粥飲下肛上更炙故麻鞋底

熨之

治大便秘脫肛兼腰痛不可忍

出十便良方
一名三神丹

石灰

白礬

黃丹

各一兩

右研以油和為餅子新瓦上燒令通赤放冷細研又和又燒如此三度為末入麝香末一分更研勻每服一錢食前粥飲艾葉調下

治脫肛不差

出聖惠方

鰲頭

一枚煉灰

蒲黃

半兩

白薇

一兩

右為末傳於肛上按抑令入日三四度差

治脫肛瀉血不止

出聖惠方

石耳

炒五兩

白礬

燒一兩反

蜜陀僧

五錢

右為末水浸蒸餅丸梧桐子大每服二十九食前粥

飲下

蛻皮散

一名鰲頭散
出千金方

治肛門脫出或因用力太過或因

洞泄不收

磁石

四兩桂心

一尺

蛻皮

一枚

右為末飲服方寸匕日一服即縮慎舉重及急帶衣
斷房室周年乃佳治女人陰脫出外用生鱉引出頭
一枚齊甲裁之炙焦搗末為四味亦治脫肛仍用破
草鞋底炙上面熨按入

壁土散

出千金方

治肛門滯出

故屋東壁土

一升

皂莢

三挺各長一尺二寸

右洗搗土為末挹粉肛頭出處次取皂莢炙暖更遞
熨取入即止

又方

出千金方

治脫肛

驚頭

故敗麻履底

各一枚

右將驚頭燒為末，傅肛門頭次，將履底按入，即不出矣。

治脫肛

出醫方大成
一名槐花散

槐花 槐角

右等分炒香黃為末，用羊血蘸藥炙熟食，以酒送下。
或云以猪脂去皮蘸藥炙服。

治大人小兒脫肛不收

出經驗良方
一名香荆散

荆芥 皂角

各等分

右為末煎湯洗了用鐵汁塗即入亦治痔及治婦人

子宮出亦如此用

治大人小兒腸頭出

出經驗良方

百草霜 五倍子

各等分

右為末醋熬成膏子以鵝毛傅上即入

蛇床散

出經驗良方

治脫肛

蛇床子 甘草

各一兩

右為末熟湯調服一錢日進三服

又方

出永類
鈴方

白鷄冠花 防風

各等分

右為末糊丸空心米飲下百丸

荊芥散

方見本門腸
風下血類

治脫肛

香茸丸

一名麝香丸方見
洩痢門腸垢類

治脫肛

治脫肛

方見本門腸風下血
類治腸風臟毒方

治積痢脫肛

出千金方

用枳實石礬磨令滑鑽孔安柄蜜塗炙令暖更易熨肛

取縮止

治赤白痢脫肛

用木瓜一握百藥煎一塊陳白梅三個以水一碗煎

至半碗無時服

治大腸虛冷脫肛及痢後脫肛

出聖惠方

乾蝸牛子

一百枚炒為末

磁石

二兩搗碎淘去赤汁

右水一大盞煎磁石五錢至五分去滓調蝸牛子末
一錢服之日三服一方為末每服二錢匕空心米飲
調下日午再服

治脫肛瀉血不止

出聖
惠方

附子

一兩燒熟地上
用盞蓋出火毒

桑黃

一兩
炙

右為末煉蜜丸梧桐子大每服二十丸食前粥飲下

治脫肛不縮

出聖
惠方

石榴皮

茜乾

各一
握

右咬咀好酒一大盞煎至七分去滓溫服

治脫肛不收

赤石脂

白礬

半生
半熟

右擦洗傳之用青物托進肛門

治腸頭挺出

用蝦蟆皮一片燒傳出處一方瓶內燒薰

治肛門滯出

出千
金方

用灸故麻履底按令入頻按入永差

治肛門脫出

出千金方

用女萎一升以器中燒坐上薰之即入

治脫肛腸出熱痛

出千金方一名蒲黃膏

用蒲黃二兩以豬脂和傅肛上內之二三度即愈以

粉塗之良

治腸隨肛出轉久不可收入

出經驗良方

用生栝蒌為粉以豬脂膏溫塗隨手抑按自得縮入
又方生搗汁溫服以豬肉汁洗手按之令暖自得入

一方用枯萆煎湯洗之

治脫肛歷年不愈

出聖惠方

用生鐵五斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再無不差并燒礬石粉傅之亦良

木賊散

出指直方

治脫肛不熱

用木賊不拘多少燒存性為末摻肛門上按之

治脫肛

出經驗良方

用磨刀水下鐵漿以毛翎塗少許於肛門上却以磨

石煎湯空心服半盞許一方用磨刀水洗

又方

出經驗良方

用貼水荷葉焙為細末好酒調下二錢又將荷葉一片將藥末二錢在葉上令人在葉上坐即入

又方

出經驗良方

用淡竹葉一把煎濃洗立效

治痔漏脫肛

出肘後方

用虎脰骨兩節重二兩酥塗炙令赤搗末水浸蒸餅

為丸如梧桐子大侵晨溫酒服二十九丸隔晚先利過
大腸然後服一方治肛門凸出燒虎骨末水服方寸
匕日三服良

治大腸脫肛

用草果去殼搥碎解頭上髻髮開留此藥於腦上髻
髮中少縛定待腸頭收上門邊即急去了藥若婦人
產後衣不下用此藥去殼搥碎縛兩腳心即下

火炮湯

用芎根不拘多少搗爛煎湯薰洗

治脫肛痔瘡等證

用葱鹽湯洗之却將薄荷煎細研葱白滴汁去滓入
蜜調煎貼患處用油單紙傳上貼之坐卧亦可

驚頭散

出千金方

治脫肛大腸久積虛冷每因大便脫肛

收不能入

用驚頭漫炙焦黃自死者尤佳為末塗傳腸頭用軟
紙襯輕輕按入仍以方寸匕食前米飲調下一方如

不愈以蠶血塗之又方燒令煙絕杵末傅臍上手按
援之一方用鞋底按入即不出

磁石散

出直指方

治脫肛

用磁石半兩蘸入煎沸醋中凡七次為末每服一錢
空心米飲調下酒服亦可次用鐵片燒通紅放冷葱
根煎湯洗淨托上

鐵粉散

出直指方

治大腸本虛風毒客熱乘之脫肛紅腫

用鐵粉研細入白飲末夾和傅之即按入又方鐵粉

以少許摻之按入即愈

橡斗膏 治脫肛

用橡子燒存性豬脂和傅按之

石灰方 治大腸積冷久年脫肛及治每因大便脫肛
援不入

用石灰炒熟以帛包裹肛坐其上冷又別換仍以海
螵蛸末傅之

文蛤散 治大腸寒肛門脫出不收用力過多及小兒

叫喚久痢後皆使脫肛悉治之

用五倍子不拘多少為末水煎汁浸洗更入白礬蛇床子尤佳洗後用赤石脂為末以少許摻在芭蕉上頻用托入或長尺餘者以兩床相接中空一尺以磁瓶盛藥水滿架起與床平令病者仰臥以其所脫浸在瓶中換藥逐日如此浸縮盡為度用海螵蛸為末塗肛上亦可一方不用蛇床子

療大人小兒脫肛每天冷食即暴痢不止肛則下脫久

療不瘥者

用紫堇草春間收紫堇草花二斤曝乾搗為末加磁石末七兩相和研細塗臍上內入即使人喫冷水於面上吸入腸中每日一塗藥喫面不過六七度即差又以熱酒半斤和散一方寸匕空腹服之日再漸加至二方寸匕以知為度若五歲以下小兒即以半杏子許散和酒令服之亦佳忌生冷陳倉米芎

治脫肛

用防已實焙乾為末如茶法煎服

又方

出直
指方

用緣桑蠋燒末和猪膏傳之立縮此蠋全似蝸牛黃
小兩後好緣葉一方亦可乾作末敷之

治大腸脫肛久積虛冷每因大便脫肛收不得

用蝸牛有小毒生研取服止消渴一方燒灰猪脂和
傳則縮

治下部脫肛

用葭若子焦炒碾細末傳之

紫葢膏

出醫方大成

治臟熱肛門脫出

用紫背葢一大握又名魚腥草搗爛如泥先用朴硝水洗淨肛門用芭蕉葉托入却用藥於臀下貼坐自然收入

治腸隨肛出

用羊脂傳上以鐵精粉傳羊脂上乃以布裹指灸令溫按內仍酒服磁石末一七日三服之

獨虎散

出直
指方

治脫肛不收

用五倍子半兩末井水三碗入磁瓶內慢火煎半續
入朴硝荊芥穗各一錢乘熱薰洗仍以五倍子末傳
之

治脫肛

用龜血灰治之一方用鱉

治肛出糞門三五寸者

出德生
堂方

用陳茶熬水溫洗去穢垢却用田螺大者二三枚水

中養一日去淨泥用黃連末少許搗起螺壓入藥末田螺內候化成水却用雞翎蘸藥掃上再以軟帛托入肛門內自然再不舉發

治大腸風冷下血不止脫肛疼痛

出聖惠方

用野狸一頭以大磁瓶一個可容得者內於瓶中以厚泥固膺候乾以大火燒之纔及煙盡住火候冷取出入麝香末半兩研令勻於磁器中收之每於食前溫粥飲調下二錢

治脫肛不縮

出聖惠方

用生韭一斤細切以酥拌炒令熟分為兩處以軟帛裹更互熨之冷即再易以入為度

又方

出聖惠方

用五花構葉不拘多少陰乾為末每服二錢食前粥飲下兼塗腸頭亦差

又方

出聖惠方

用蛇床子一兩炒為末貼之

治脫肛腸出

出經驗良方

用黃連研細末冷水調常塗腸頭

治卒大便秘肛

出肘後方

用豆醬清合酒塗之

釣腸丸

出聖惠方

治大腸虛冷脫肛不收及腸風諸症

牛蒡子 赤芍藥 防風 荆芥穗 甘草 當

歸

各等分

右先以獼猪大腸頭長一尺二寸者兩三枚於沙鍋

內用水四五盞煮爛熟去腸頭入前藥煎四五沸取汁薰洗數次令肛軟却以黑芝麻燒煙薰之

硃砂丸 治冷熱不和下部痛裏急後重虛滑或結澀腸頭脫出

硃砂

飛一兩

硫黃

研一分

白礬

研一分

以上三味同研勻用萊菔一枚重五兩者割開留元蓋子剗作坑子填上件末在內蓋好用竹簽定以麵劑十五兩裏開地坑一所方一尺鋪馬糞厚三寸安

麵毬在上更以馬糞蓋之上發火燒候通黑即上去
麵將菜菔藥搗爛如膏更入後藥

肉豆蔻

去殼

葫蘆把

各半兩

訶梨勒皮

附子

懷香

子

一分炒

補骨脂

炒各兩

右六味為末通前藥膏同搗滴少好酒和納令勻
丸如梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前
溫米飲下

赤石脂散

治大腸風冷久痢不瘥脫肛

赤石脂 龍骨 白石脂 各一兩 當歸 半兩 蓬莪茂

肉豆蔻 去殼 黃連 去鬚 白芍藥 厚朴 各半兩 蓬莪茂 去粗皮薑汁

炙

右為散每服二錢粥飲食前調下

卷栢散 治久病痢不瘥脫肛

卷栢 一兩 訶梨勒 皮煨用 黃連 去鬚 縮砂 去皮 肉豆蔻 去殼

萆撥 白石脂 各一兩

右為末每服二錢粥飲食前下

地榆芍藥湯 治洩痢膿血乃至脫肛

蒼朮

八兩 地榆

二兩

卷栢

三兩

芍藥

三兩

右咬咀每服一兩水一大盞半煎一盞溫服

龍骨丸 治諸痢疾脫肛久不止

龍骨 艾葉

炒各一兩

鯨頭骨

二枚

塗醋炙令焦黃

右為散每服二錢粥飲食前調下

黑聖散 治瀉痢日久脫肛疼痛

用大蜘蛛一枚以瓠子葉兩重裹以線繫定合子內

燒令黑色勿太過細研入黃丹少許研勻每先用白礬葱椒煎洗湯浴拭乾後將藥摻在軟帛上將手掌按托上肛頭即不下

歲十月樞僕院判白文舉老僕面塵土長跪曰病脫肛日久服藥未驗近日復以赤白膿痢作裏急後重白多赤少不任其苦予乃曰此非肉食膏粱必多蔬食或胃氣不節其寒一也衣蓋或薄寒侵形體其寒二也況天氣應時其寒三也不禁而腸頭脫下者寒也

滑也真氣不禁固也形質不收乃血脫也此乃寒滑
氣泄不固故形質下脫也當療之以澀去其脫而除
其滑微加酸味固氣以大熱之劑而除寒補陽以補
氣之藥升益氣名之曰訶子皮散

訶子皮散

出東垣
蘭室方

御米殼

去花萼蜜
炒半錢

訶子

煨去核
七分

乾薑

炮六
分

橘皮

半
錢

右為末分作二服每服水二盞煎至一盞和滓溫服
空心一服減半再服瘥愈

治腸頭出

出本
草

用胡荽子搗醋煮熨腸頭出甚妙

治脫肛

出本
草

用甌帶煮汁服

治卒脫肛

出本
草

燒蜘蛛為末傅肛上

治脫肛

出本
草

以年久筆頭燒灰水服之

治肛帶出

出本草

切胡荽子一升燒以煙薰肛即入

治脫肛

用益母草炙令香浸酒服之

益母草生山谷水澤葉如澤蘭莖赤高二三尺

是也

肛門有蟲怕癢

論

夫肛門有蟲者由胃弱腸虛而蟻蟲下乘之也肛門為大腸候蟻蟲者九蟲內之一蟲也在胃間若臟腑氣

實則蟲不妄動胃弱腸虛則蟯蟲乘之重者成瘡或蟲
從肛門溢出輕者慢蝕肛但癢也

蟯娘丸

出聖
惠方

治肛門癢或出膿血有蟲傍生孔竅內

蟯娘

七枚五月五日收
去足翅炙為末

新牛糞

半兩

好肥牛肉

一兩
炒令

香

右搗如膏丸如蓮子大炙令熱以新綿薄裹內下部
中半日少喫飯腹中有蟲俱出三日五度永差

又方

出聖
惠方

白蒺藜

五錢 炒

硫黃

一分 細研

猪牙皂角

一兩 燒灰

右為末入硫黃同研勻用葱薤汁丸如蓮子大綿裹

一丸內下部中日二三易

又方

出聖惠丸

雄黃

胡粉

各半兩

右研以棗肉丸如蓮子大以綿裹一丸內下部中日

再易之

肛門赤痛

論

夫肛門大腸之候其氣虛為風熱所乘熱氣擊搏故令
肛門赤痛也

檳榔散

出聖惠方

治大腸風壅氣毒攻肛門赤腫疼痛

檳榔

川大黃

各一兩

沉香

赤芍藥

防風

去叉

芍藥

犀角屑

甘草

炙剉各半兩

枳殼

三分麩炒去穰

右咬咀每服四錢水一盞煎六分去滓食前溫服

牛蒡子散

出聖惠方

治大腸風毒肛門赤痛令人煩熱坐

卧不安

牛蒡子

炒

川大黃

剉炒各一兩

黃耆

剉

白蒺藜

炒去刺

枳殼

三分麩炒去穢

當歸

剉炒

芎藭

甘草

炙剉各半兩

右咬咀每服四錢水一盞煎至六分去滓食前溫服

大黃散

出聖惠方

治大腸風熱所攻肛門赤腫

川大黃

剉炒

黃芩

黃耆

玄參

各一兩

丹參

三分

赤芍

藥

半兩

枳殼

一兩麩炒去穢

右為末每服二錢食前粥飲調下

治大腸風壅氣毒攻肛門赤腫疼痛

出聖惠方

枳殼

麩炒
去穢

芎藭

沉香
各半
兩

川朴硝

一兩
半

川大黃

一兩
對炒

甘草

一兩
炙炒

右為末每服二錢食前清粥飲調下

又方

出聖
惠方

皂莢樹白皮

一兩
塗醋炙

甘草

半兩
剉炙

枳殼

二分
麩炒去穢

右為末每服二錢食前粥飲調下

治穀道蜜赤腫痛又痒方

用杏仁杵作膏傅之一方熬令黃搗以綿裹塞之

又方

出本草

用雄黃塗在上良

治肛門腫痛

用鱉子去殼取肉四五枚研如泥安新磁器或木盆內以沸湯衝動薰洗以少許塗患處

又方

用枳殼燒薰煎枳殼洗服枳殼末為上藥

地榆散 治肛門痛痒或腫

地榆 荊芥穗 蛇床子 蒴藿 苦參

各等分

右咬咀每用藥一匙水一椀煎二三沸去滓通手避風處洗患處

三黃丸 治肛門腫痛或下鮮血

黃連 黃芩 大黃

各等分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服四十丸熟水吞下

普濟方卷四十

欽定四庫全書

普濟方卷四十一

明 周王朱橚 撰

小腸腑門

總論

小腸腑者主心也舌是其候也心合於小腸小腸者受
盛之府也號監倉吏重二斤十四兩長二丈四尺廣二
寸四分難經甲乙云三丈二尺大二寸半徑八分寸之少半後附脊左迴疊積其
注於迴腸者外傳臍上回運環反十六曲常留水穀二

斗四升其一斗二升是水一斗二升是穀應主二十四

氣也

難經云十六曲盛穀二斗四升水六升三合
合之大半甲乙云受三斗三合合之大半

唇厚

人中長以候小腸 小腸病者小腸疼腰脊控而痛時

窘乏復耳前熱若寒甚獨肩上熱及手小指次指之間

熱若脉滑者

脉經作陷
甲乙同

此其候也 小腸控臑引脊上

衝心牙在小腸者連臑系屬於脊貫肝肺絡心系氣盛
則逆上衝腸胸動肝肺散於育結於臍故取之育原以散
之刺太陰以與之取厥陰以下之取巨虛下廉以去之按

其所過之經以調之 左手關前寸口陽絕者無小腸
脉也若臍痺小腹中疝瘕王月即冷上搶心刺手心主
治陰心主在掌後橫文中入一分在關前寸口陽實者
小腸實也若心下及熱痺小腸內熱小便赤黃刺手太
陽治陽手太陽在手小指外側本節陷中 小腸有寒
其心下重便膿血有若處痔小腸有宿食常暮發熱明
日止小腸脹者小腹腫脹引腹痛心前受病移於小腸
心欬不已則氣與欬俱出厥氣客於小腸夢聚邑街衢

心應皮皮厚者脉厚脉厚小腸厚皮薄者脉薄脉薄小腸薄皮緩者脉緩脉緩者小腸大而長皮薄而脉冲小者小腸小而短諸陽經脉皆多紆屈者小腸結 扁鵲云手少陰於太陽為表清表濁清實濁虛故食下腸實而貫故腹實而不薄實則腹熱熱則口張口為之生瘡虛則傷寒寒則便泄膿血或發裏水其根在小腸先從起 小腸絕不治六日死何以知之髮直如乾麻不得屈伸自汗不止

小腸實 附論

夫小腸者受盛之官心之腑也手太陽其經也其氣盛則為有餘故左手寸口人迎以前脉陽實者小腸實也實生熱是有身熱來去口乾心煩身重汗不出小便不利之證治宜瀉之

方

升麻散

出聖惠方

治小腸實口乾舌燥心胸煩悶小便不利

川升麻

黃蘗

劉

杏仁

湯洗去皮尖雙仁者麤炒微黃

犀角屑

桔萼根 桑白皮剉 葵子 木通 葳蕤 川大

黃

剉碎微炒

甘草

半兩

右為細末每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前

溫服

犀角湯

出聖惠方

治小腸實熱心煩口瘡小便赤澀

犀角

鎔

瞿麥穗

杏仁

去皮尖雙仁麤炒

梔子

去皮

赤茯苓

去黑皮

木通

黃連

去鬚各二分

白茅根

剉一分

甘草

半兩

麥門冬

去心焙一兩

右為末搗篩每服三錢匕水一盞入竹葉二七片煎至六分去滓溫服不拘時候

柴胡澤瀉湯

出千金方

治小腸熱脹身熱手足心熱汗不

出心中煩滿結塞不通口瘡身重

柴胡 澤瀉 橘皮 黃芩 旋覆花 枳實

升麻 芒硝

各三兩

生地黄

切一升

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓芒硝分三服無時

下

樹爵金散 治小腸實熱熱則心下急痺口舌生瘡

樹爵金

一分

白附子

三分

羌活

一分

甘草

半兩

黃連

一分

黃芩

三分

川大黃

一分

麥門冬

一分

川升麻

三分

右為細散每服食後煎麥門冬湯調下忌炙燂熱麵

樹爵金散 治小腸實熱心下急痺口舌生瘡

樹爵金

一分

白附子

半兩

羌活

三分

甘草

半兩

黃連

一分

黃芩

一分

心半

側柏

半兩

大黃

劉炒

乾蠍

去土炒

半兩

右為細散醋和勻每服二錢七食後薄荷熱水調下

生薑蜜湯下亦可

赤茯苓湯

治實熱面赤多汗小便不利急痛

木通

去節

赤茯苓

去皮

檳榔

生地黃

焙

黃芩

赤芍

藥

各三分

甘草

炙半兩

麥門冬

去心焙三分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至八分去

滓溫服不拘時一方無生薑煎

瞿麥湯

一名黃連散

治小腸實熱小便黃赤結不通

瞿麥

犀角

鎔

猪苓

去黑皮

防己

各三分

黃連

車前

子

木通

剉各一兩

甘草

炙剉一兩

右搗篩每服三錢匕水一盞煎取七分去滓溫服不

拘時

木通散

治小腸實熱心煩悶小便澀腹中急疼痛

木通

剉一兩

檳榔

羚羊角屑

赤芍藥

黃芩

當歸

微炒剉

車前子

各三分

甘草

炙半兩

右為散每服四錢水一中盞煎至六分去滓食前溫

服

大黃丸

出千金方

治小腸熱結滿不通

大黃 芍藥

葶藶

各二兩

大戟

朴硝

各三兩

杏仁

五十枚

巴豆

去油七枚

右為末蜜和丸如梧桐子大食後大人七丸小兒二

三丸日去一服

麥門冬湯

楊子建護命方

治小腸實熱脉氣盛實小便下血

服此

麥門冬

去心焙

知母

蒲黃

黃芩

去黑心

木通

劉升

麻

各一兩

大黃

右搗篩每服三錢匕以水一盞煎至八分去滓食後

溫服

滑石散

治下焦帶陰中疼痛小便艱澀

滑石

一兩研

甘草

炙對

大黃

劉炒

黃耆

地椒

山梔子

去皮各半兩

乳香

一錢研

右為散食前乳香酒調下一錢匕未愈再服

胡荽湯

治小腸風熱小便黃赤澀結不通

胡荽 車前子 木通 防己 瞿麥穗 犀角

鎊

黃連

去鬚各等分

右為散每服五錢匕水一盞半煎至八分去滓食後溫服日進三服

射干湯

楊子建護命湯

治小腸實熱小便赤澀疼痛不可勝

忍

射干 黃芩

去黑心

麥門冬

去心焙

大黃

剉焙

知母

木

通

剉等分

右為散每服三錢匕水一盞入葱白五寸切碎同煎至八分去滓食後溫服以利為度若三服以上未通急煎芎藭湯一盞投之即下自早至夜可兩服不可常喫

海蛤丸

出聖惠方

治小腸實熱小腹滿小便赤澀

海蛤

三分

漢防己

半兩

甜葶藶

半兩

隔紙炒令香

檳榔

半兩

木通

半兩猪苓

半兩去黑皮

右為末煉蜜丸如桐子大每服食前煎冬葵根湯下

二十丸

地黃湯

出聖惠方

治小腸實熱心中煩悶小便出血

生地黃

白茅根

各半兩

蔥白

二錢焙

右剉如麻豆大水三盞半去滓食前分溫三服

小腸虛

附論

夫小腸者受盛之官心之腑也手太陽其經也其氣虛則為不足故在手寸口人迎以前脉陽虛者小腸虛也虛則生寒是故有顙際頭角偏痛耳聾不聰驚跳小便

數之證治宜補之 小腸者受盛之官化物出焉承奉
胃司受盛糟粕受以傳於大腸是謂化物者也其經有
寒則亦傳於大腸故化物難而又腸中懊痛便痢赤白
脉經謂小腸寒則令人下重便膿血者是也

方

牡蠣丸

楊子建
護命方

治小腸虛寒小便頻數便下有膜如乳酪狀

牡蠣

火煨
細研

草薢

川續斷

益智仁

去殼

石斛

去根

芎藭

淮牛膝

酒浸
切焙

狗脊

去毛

五味子

石硫黃

另研

山茱萸

巴戟天

去心龍骨各等分

右為末煉蜜丸如桐子大空心鹽湯下四十九小便

止即已不必服一方杵為末入鹽煎空心頻頻服不止再煉蜜丸服

烏梅丸 治小腸寒下痢赤白

烏梅

一百箇

乾薑

炮

黃連

去鬚各三兩

當歸

切細辛

去苗葉

附子

炮製去皮臍

桂

去麤皮

蜀椒

去目并閉口炒出汗

黃蘗

去麤皮剉人

參

各一兩

右將九味搗為細末以苦酒漬烏梅一宿去核蒸令爛別搗如泥攪勻更入煉蜜少許和丸如梧桐子大每服十丸米湯下食前日三服至二十丸

益智丸

楊子建護命方

治小腸虛寒小便後餘瀝陰痿不起

益智子

去皮

草薢

狗脊

去毛

芎藭

巴戟天

去心

乾木

瓜

續斷

牛膝

酒浸切焙各半兩

附子

炮製去皮臍大者一枚

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服四十丸空心鹽湯

下

懷香子丸

一名附子丸
出聖惠方

治小腸虛冷小腹疼痛不可

忍

懷香子

炒

桂去麝皮
各一兩

附子

炮製去
皮臍

當歸

切
焙

華澄茄

木香

赤石脂

各三分

蜀椒

去目及開口者
微炒出汗半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服溫酒下二十九空

心食前一方有川烏三分

溫腸丸

治小腸虛冷下痢便泄膿血腸滑懊懷

補骨脂

炒一兩

肉蓯蓉

酒浸去皮
焙一兩

狗脊

剉三分

獨活

去
蘆

頭三

附子

炮製去皮臍

巴戟天

去心鹿茸

酒炙去毛各一兩

五味

子三

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸鹽湯或

酒任下

乾薑黃連湯

出千金方

治小腸虛寒頭偏疼耳頰痛痢下

赤白腸滑腸中懊懷腹中疼痛裏急後重

乾薑

三分炮

當歸

切焙

黃蘗

去粗皮

地榆

各四兩

黃連

去鬚

阿

膠

各二兩炙令燥

石榴皮

三枚焙

右㕮咀以水七升煮取二升五合去滓下膠煮取膠
盡分三服一方加茴香

沉香湯

出聖惠方

治小腸虛寒臍下急痛小便滑數

沉香

剉桂

去粗皮

附子

炮製去皮臍

白龍骨

各一兩

木香

當歸

各二錢

枳實

去穰麩炒半兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞入生薑半分煎至六
分去滓食前服

木香丸

治小腸寒便利赤白腸滑

木香

黃連

去

訶子皮

無食子

各半兩

赤石脂

一兩

厚朴

去粗皮生薑汁炙剉碎

當歸

切焙各三分

右為細末炊棗肉為丸如梧桐子大每服二十九食前溫米飲下

吳茱萸散

出聖惠方

治小腸虛冷小腹如刀刺或繞臍結

痛冷汗出

吳茱萸

一分湯浸七遍焙乾微炒

厚朴

半分去粗皮塗生薑汁炙令熱

芎藭

半兩

乾薑

半兩炮剉

甘草

半兩炙

附子

三分炮製去皮臍

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時溫服

椒附丸

一名鹿茸丸
出聖惠方

治小腹虛冷小便頻數

椒紅炒出汗

桑螵蛸

酒炙龍骨

生用一方白
者燒過用

山茱萸

取肉

去核附子

炮去皮臍

鹿茸

酒蒸焙一
方用酥炙

右等分細末酒糊丸如梧桐子大每服七十九空心

鹽湯下一方煉蜜為丸

厚朴散

治小腸受寒腸痛下重便利膿血

厚朴

去粗皮生薑汁製炙判

黃連

去鬚微炒

乾薑

炮

當歸

切焙各一兩

白茯苓

去黑皮

無食子

各半兩

右為細末每服二錢匕食前米飲調下

阿膠湯 治小腸寒腸中懊痛下赤白

阿膠

炙燥二兩

桂

去粗皮

生薑

切焙各半兩

黃連

去鬚三分

右為散每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓稍熱

日三服

寸金丸

出百一選方

治元陽虛弱寒氣攻衝膀胱小腸發

腫作痛或在心脇之間擗連屬陰間致身體增寒撮痛不可忍

楮實子

川棟子

炒各一兩半

巴豆

炒七箇去皮油

全蝎

炒四十箇

當歸

去皮酒浸一宿一兩半

右為細末用浸當歸酒打麴糊和丸如雞子實大空心溫酒鹽湯下吞二丸或三丸併進二服

蓬莪朮散

楊子建護命方

治小腸虛冷時發刺痛

蓬莪朮

炮

懷香子

炒

芎藭

牛膝

酒浸切細各半兩

桂

去粗

皮一分

右為散每服三錢匕銀石器內煎葱湯調下

牛膝丸

楊子建
護命方

治小腸虛冷小便頻數日夜五六十

次

牛膝

酒浸
切焙

續斷

芎藭

各半
兩

草薢

二
兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大空心鹽湯下四十丸或

用鹽煎服

厚朴散

出聖
惠方

治小腸虛冷氣小腹卒疝痛如割胸脇

氣滿悶亂不可忍

厚朴

一兩去粗皮塗生薑汁炙令香熟

高良薑

一兩對

當歸

三兩對微炒

桂心

一兩芎藭三分

白芍藥

三分

右為散每服三錢水一盞煎至六分去滓不拘時熱服

木香湯

治小腸有寒下利赤白腹痛下重

木香

三分黃連

去鬚微炒

當歸

切微炒各一兩

附子

炮制去皮臍一兩半

厚

朴

去粗皮生薑汁炙三兩

吳茱萸

湯洗七遍焙乾炒半兩

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓稍熱食前服

斷弓絃散

出續易簡方

治小腸虛冷寒撮痛併婦人血刺

心痛

五靈脂

蒲黃

等分

右同研為散每服二錢七先用醞醋一合熬藥成膏以一小盞煎至七分熱呷下

治小腸虛熱忽因酒後頓啣冷水薺汁梨小柑子果食

生冷之類冷氣偏勝裹着熱氣結於小腸其病狀臍下結塊如癰瘡堅硬不通連通外腎俱腫宜服此方診其脉短此即陰中有伏陽也但結塊當臍下堅硬不通者服之無有不驗也

出楊子建
護命方

吳茱萸

一分

半兩

木通草

五錢

半夏

二錢

右件細杵羅為末每服三錢以水一盞葱三莖同煎取八分空心和平啣喉間得瘰處痒即續進一盞其瘰處痒後散滿一服即啣後方

治小腸冷熱不調取結氣方

出楊子建
護命方

吳茱萸 木通草 芎 官桂 大黃

炮炒

細辛

藁本

獨活

各一兩

生牽牛熟牽牛

各半兩

半夏

四錢

右件細杵羅為末每服四錢牽牛半夏末二錢諸藥
二錢合為四錢濃煎蔥湯空心調下以大腑快為度
未通再酌量臟腑尋常帶熱即使大黃若不帶熱不
使也

治小腸頻數不計度數臨小便時即陰莖內疼痛不可

勝忍凡人得此疾必先大腑秘熱不通水只就小腸中行大腑乾渴即不通也大腑熱甚即渾身熱心煩常思涼處愛吃涼水如此即得之重也詳此候本因貪酒好色臟腑中有熱毒之氣流行於小腸故小便時令痛也若不因貪酒必平生愛吃葷膩辛熱毒之物腸中行引此熱毒積如腐爛者瘀血之類又因色傷小腸氣虛水就小腸行致有斯疾此與淋病不同俱小便頻數每度止有一盞半盞已來若是澀而疼痛者治之不同也治

小便頻數不計度數臨小便時疼痛不可勝忍宜服此

方

出楊子建
護命方

草薺

一兩用水浸少時漉出用鹽半兩相裹鍋內炒乾去鹽不用

右件細杵羅為末每服三錢水一盞同煎取八分和
滓空心服此藥兩盞後便噤後方

治肝肺熱毒蒸鬱臟腑因生積滯其積者如腐爛瘀血
之類熱毒熾盛大腸乾渴又因色傷小腸虛冷水道乘
虛只行於小腸故小便常數而疼痛不可勝忍急宜服

此化熱毒方然後非時以葱湯洗穀道并內藥於穀道中令上下相感引水道下入大腑即自然小便不數疼痛自止也緣此病大腸熱渴小腸虛損下熱藥固小腸則大腸愈竭而病愈增下冷藥通大府則小腸愈數而病不減當此之際醫之莫不為難也嘗以此方治之得驗故備錄之使後來者觀之更生高見則萬世生靈無夭折者矣

治小便頻數肝肺有熱以致疼痛宜服此化肝肺熱毒

方

出楊子建
護命方

杏仁

牡丹皮

去心

黃芩

虎杖

麻黃

去根節

木香

芍藥

柴胡

升麻

紫苑

貝母

連翹

荊芥穗

羌活

各等分

右件細杵羅為末服二錢匕生薑二小塊同煎八分

食後瀘淳徐徐熱喫服此藥後常暖葱湯於腳盆內
探手掬水洗穀道使大腸與肺氣交感表裏上下相
通引行水道轉入大腸漸次出後通即便減得小便

并疼痛也大腑既通噤後方藥便噤積滯方乃得全

安大腑若不通即以牽牛半兩皂角半兩杵為細末

舊葦管盛藥末二錢匕內在穀道中一寸已來吹之

即化積滯通大腑方

方列前腸腑門大便秘澀不通類

利小腸

出本草

以小麥苗絞汁服之

滑小腸

出本草

用冬葵子細剉以水煎服一盞食之一方

葵子葉煮汁服之

治小腹堅大如盤胸中滿能食而不消

出本草

用麴末服

方寸七日二服

普濟方卷四十一

欽定四庫全書

普濟方卷四十二

明 周王朱橚 撰

膀胱門

總論

夫膀胱者主腎也耳中是其候也腎合氣於膀胱者津液之府號水曹掾名玉海重九兩二銖左迴疊積上下縱廣九寸受津液九升九合兩邊等應二十四氣鼻孔在外膀胱漏泄 黃帝曰夫五腑各一名各一形腎乃

獨兩何也岐伯曰膀胱為腑有三處腎形應腑有二處
臟名一腑名二故五臟六腑也一說腎有左右而膀胱
無二今用當以左腎合膀胱右腎合三焦 左手關後
尺中陽絕者無膀胱脉也病苦逆冷婦人月水不調至
月即閉男子失精尿有餘瀝刺足少陰經治在足內踝
下動脉是也 右手關後尺中陽絕者無子戶脉也病
苦足逆寒絕產帶下無子陰中寒刺足少陰經治陰
左手關後尺中陽實者膀胱實也病苦逆冷脇下邪氣

相引痛刺足太陽經治陽在足小趾外側本節後陷中
右手關後尺中陽實者膀胱實也病苦小腹滿引腰
痛刺足太陽經治陽病先發於膀胱者背脊筋痛小
便閉五日之腎小腹腰脊痛脛酸一日之小腸脹一日
之閉塞不通身痛體重二日不已死冬雞鳴夏晡一云
日西膀胱病者小腹偏重而痛以手按之則欲小便
而不得肩上熱若脉陷及足小趾外側及脛踝後皆熱
若脉陷取委中膀胱脹者小腹滿而氣癢若腎前受病

傳於膀胱腎冷不則遺溺厥氣客於膀胱則夢遊行
腎應骨密理厚皮者三焦膀胱厚粗理滿皮者三焦膀
胱薄腠理疎者三焦膀胱緩急皮而無毫者三焦膀胱
急毫毛美而粗者三焦膀胱直稀毫毛者三焦膀胱結
也扁鵲云六腑有病徹面形腎膀胱與足少陰太陽
為表裏膀胱總通於五臟所以五腑有臟即應膀胱有
疾即應囊傷熱則小便不通膀胱急尿苦黃赤傷寒則
小便數清白或潑石水根在膀胱四肢小其腸大也骨

不絕治齒黃落十日死

膀胱實熱

夫左手尺中神門以後脉陽實者足太陽經也病苦逆痛腰中痛不可俛仰面腫目黃口舌燥咽腫痛體重四肢氣滿小腹偏痛胞轉不得小便頭眩痛煩滿脊背熱強體名曰膀胱實熱也內經曰膀胱不利為癰者以此

方

赤茯苓散

出聖惠方

治膀胱熱腹脹小便不通口舌乾燥咽

腫不利

赤茯苓

瞿麥

各一兩

射干

半兩

子苓

桑螵蛸

微炒

漢

防己

羚羊角屑

川升麻

川大黃

劉微炒

大青

木通

劉各三分

右為散每服三錢水一盞煎六分去滓不拘時溫服

葵子湯

出永類
鈴方

治膀胱實熱腹脹小便不通口舌乾

燥咽腫不利

赤茯苓

去皮

猪苓

去皮

冬葵子

枳實

麩炒

瞿麥

木通

去節

黃芩

車前子

炒

滑石

甘草

炙各等分

右咬咀每服四錢水一盞薑五片煎至八分不拘時

去滓溫服

榆皮散

出聖惠方

治膀胱實熱小便赤澀

榆白皮

剉

車前子

葵根

木通

瞿麥

白茅

根黃芩

各三分

桑螵蛸

微炒

赤茯苓

各一兩

右為散每服三錢水一盞生薑半分同煎至六分去

滓食前溫服

大黃散

出聖惠方

治膀胱實熱腹脹滿小便不利

川大黃

剉微炒

冬葵子

瞿麥

各一兩

黃芩

赤茯苓

去皮

紫蘇莖葉

檳榔

木通

白茅根

剉各三分

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎六分去滓食

前溫服

梔子散

出聖惠方

治膀胱實熱小腹煩悶小便不利

梔子仁

石膏

二兩

白茅根

剉一兩

赤茯苓

一兩

犀角屑

一兩木通

剉一兩

黃芩

一兩

甘草

半兩

剉

右為散每服五錢水一盞淡竹葉二七片生薑黃半兩煎至七分去滓食前溫服忌炙烤熱麵

猪苓散 治膀胱實熱小便不通腰腹重痛煩躁

猪苓 防己 梔子仁 滑石 車前子 檳

各一兩

榔 大黃

生剉各二兩

右為散每服二錢水調下或水一盞煎至七分溫服

梔子仁湯

一名濕熱湯
出千金方

治膀胱實熱小便不通煩悶

不解腰脊痛舌乾咽

梔子仁

二兩

石膏

四兩

赤茯苓

去黑皮

知母

炒各二兩

生地黄

淡竹葉

各切半升

芒硝

一兩

右咬咀如麻豆大每服四錢匕水一盞煎至一盞去

滓溫服一方入蜜煎服

漢防己散

出聖惠方

治膀胱實熱小便不通

漢防己

一兩

海蛤

半兩

滑石

一兩

葵子

半兩

猪苓

半兩去黑皮

瞿

麥

半兩

右為散每服食前濃煎木通湯調下二錢

瞿麥飲 治膀胱實熱小便不通壅閉煩躁

瞿麥

黃芩

甘草

木通

剉各一兩

葵根

剉洗

車前子

各半兩

右為散每服四錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

檳榔飲 治胞囊實熱澼便癰閉日夜不通

檳榔

羚羊角

大黃

剉各半兩

甘草

剉炙

赤茯苓

剉去黑皮

防己

各二兩

右為散每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓溫服

升麻散

出千金方

治膀胱熱小便不通舌咽腫

升麻

大青

各三兩

射干

元參

黃蘗

去粗皮

薔薇

根白皮

各四兩

右咬咀如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎至一盞
臨熟入蜜一匙打勻去滓服一方下蜜更煎兩沸細
細令咽名升麻煎

石膏湯

治膀胱實熱小便癰閉舌燥飲引煩悶

石膏

生梔子

去皮

赤茯苓

去黑皮

甘草

炙

木通

各一兩

右為散每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

車前子散 治膀胱利小便解悶熱

車前子

海金沙

井泉石

滑石

碎各一兩

葶藶

紙上

炒一分

右為散每服二錢匕蜜熱調下未利再服一方治小便不通用新汲水調下

滑石湯

出千金方

治膀胱急熱小便黃赤

滑石

八兩

子芩

三兩

車前子

冬葵子

一升

榆白皮

四兩

右以水煎取三升分三服

抵聖丸 治膀胱熱多因天氣發熱外腎腫脹赤痛大便澀而飲水按之臍腹痛者

續隨子 薏苡仁 郁李仁 茵芋 白牽牛

各等

分

右為末滴水丸如梧桐子大每服五丸以靈秘散下黃昏時服五更利下惡穢之物一方用香薑散噉

靈秘散

宣連

二兩去鬚
生薑
四兩判如
細剉小塊
萊豆大

右拌勻密器收貯經宿於銀石器內慢火同炒至黃
焦去黑薑不用揀取黃連為末每服二錢空心淡茶
清調吞下抵聖丸

兼金丸

出二
大方

治膀胱臍腹上下兼肋脇痛疼便燥欲

飲水按之痛者

大黃

八錢濕
紙裹煨

硝石

桂心

甘草

各四
兩

桃仁

四十
枚去

皮尖
細研

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服五七十九空心米飲送下婦人血閉疼痛亦宜服之

坎離丸 滋腎水補下元不足去膀胱積熱

知母

一兩

黃柏

黃連

各等分

右為末水丸如梧桐子大食前溫水送下五十丸

芒硝散 治膀胱熱結不通

芒硝

另研半兩

赤茯苓

去黑皮末一兩

右為末研和勻每服二錢匕水一盞調下心煩熱燥

者冷蜜水下

治膀胱實熱腹脹小便赤澀水氣流腫

出聖惠方

取浮萍草乾細羅為散每服食前葱白湯調下一錢

一方治胞轉不得小便冷水調下二錢

治膀胱積熱小便赤澀不快

麥門冬去心 山梔子 子芩 茯苓 升麻 麻黃

去根各一分 通草四銖

右細杵羅為末每服二錢水一盞煎八分食後徐徐

熱服

治膀胱虛熱下砂石澀利水道

出本草

以故甑蔽燒灰研食前溫酒調下一錢匕

膀胱虛冷

附論

右手尺中神門以後脉陽虛者太陽經也病苦脚中筋
急腹中痛引疼腰背不可屈伸轉筋惡偏枯腰痛外踝
後痛肌肉振動耳聾忽不聞惡風颼颼作聲小便利多
項背尻痛小便不禁尿多白色面黑脛酸兩脇脹滿名

曰膀胱虛冷也內經曰膀胱不約為遺溺

龍骨丸

出千金方

治膀胱腎冷坐起欲倒目眩中氣不足

骨痿

龍骨

栢子仁

乾地黄

甘草

防風

各五分

禹

餘糧

白石英

桂心

黃耆

茯苓

各七分

五味

子

羌活

人參

附子

各六兩

山茱萸

元參

芎藭

各四分

磁石

杜仲

乾薑

各八分

右為末蜜丸如梧桐子大空心酒服三十九日加至

四十九

石斛散

出聖惠方

治膀胱虛冷兩脇脹滿脚脛多疼腰強

痛小便滑數

石斛

一兩去根判

附子

一兩炮去皮臍

五味子

三分

澤瀉

三分

三分

牛膝

三分去苗

白茯苓

三分

沉香

三分

人參

去蘆三分

三分

石

三兩搗碎水淘去赤汁

黃耆

半兩

肉蓯蓉

一兩酒浸去皺皮微炒

懷香子

三分

枳實

三分麩炒微黃

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至五分去滓

食前溫服

華澄茄丸

出聖惠方

治膀胱虛冷氣腹脇脹滿腰脚冷痛

面色多黑體重無力

華澄茄

一兩

安息香

木香

一兩

肉桂

一兩半

去粗皮

附子

一兩

炮製去皮臍

當歸

半兩

剉微炒

補骨脂

懷香子

各一兩

沉香

一兩

檳榔

肉豆蔻

青皮

浸去白皮

微炒

吳茱萸

湯浸七遍焙乾

微炒 桃仁

各半兩

浸去皮尖雙仁麩炒

右為末酒煮麵糊和搗三二百杵丸如梧桐子大每

服食前以溫酒下二十丸

腎瀝湯

出聖惠方

治膀胱及腎臟虛冷小便色白稠濁日

夜無度恒腰脇疼痛

肉蓯蓉

一兩酒浸一宿刮去皺皮炙乾

漢椒

去目及閉口者微炒出汗

五味子

各半

附子

一兩炮

乾薑

半兩炮

人參

去蘆

黃耆

澤瀉

芎藭

牛膝

去苗各三分

當歸

半兩

石斛

三分去根剉

磁石

二兩

搗碎水淘去赤汁以帛包

桂心

半兩

右為散每服五錢水一盞用羊腎一對切去脂膜每

用磁石包子及入棗三枚煎至五分去滓食前溫服

杜仲散

出聖惠方

治膀胱虛冷氣攻注腰膝疼痛

杜仲

一兩去粗皮微黃剉

附子

一兩炮製去皮臍

石斛

三分去根

檳榔

當歸

剉微炒

牛膝

去苗

桂心

丹參

去蘆

木香

白茯苓

青橘皮

浸去白皮焙

懷香子

各三分

右為散每服三錢水一盞生薑半分煎至六分去滓

食前溫服

鹿茸丸

出聖惠方

治膀胱虛冷面色萎黑小便不禁腰膝

酸疼兩脇脹滿不能飲食肌膚消瘦

鹿茸

去毛塗酥
炙微黃

肉苁蓉

酒浸去皺
皮微炙

附子

各一兩炮
裂去皮臍

桑螵蛸

半兩
微炙

石斛

一兩
剉

懷香子

鍾乳粉

研入

白龍

骨

沉香

各一兩
兩

兔絲子

一兩
半

磁石

一兩
半

木香

一兩

右為末研藥合勻以酒炙麵糊丸如梧桐子大每服以溫水下二十丸漸加至四十丸空心及晚食前服

黃耆丸

出聖
惠方

治膀胱及腎臟久虛積冷上焦煩熱小

便滑數如米泔

黃耆 乾地黃 土瓜 各一兩 元參 栝蒌根 白

龍骨

菰菰

剉

牡蠣

各一兩 燒為粉

人參

二分 去蘆

桑螵蛸

三分

微炒

五味子

一兩

沉香

一兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服食前以粥飲下三十丸

韭子丸

出醫方集成

治膀胱腎冷小便白濁滑數日夜無

度

赤白脂

煨

韭子

炒

川牛膝

酒浸去蘆土

牡蠣

煨

覆盆子

酒浸附子

炮去皮臍

桑螵蛸

酒炒

鹿茸

酒蒸焙

肉蓯蓉

酒浸龍骨

生各一兩

雞臍脰

燒灰

沉香

不見火半兩

右為細末酒糊為丸如梧桐子大每服七十九空心鹽湯溫酒任下一方無牡蠣

治膀胱冷欬唾則有血喉喘息

出千金方

羊腎

具一

人參

元參

黃耆

桂心

芎藭

甘

草

各三兩

茯苓

四兩

地骨皮

生薑

各五兩

白朮

六兩

右㕮咀以水一斗二升先煮羊腎減三升去腎下藥

煮取三升去滓分為三服

韭子散

出聖惠方

治膀胱虛冷小便白濁滑數日夜無度

韭子

一兩微炒

赤石脂

一兩

土瓜根

一兩

狗脊

一兩

牛膝

一兩去苗

牡蠣

二兩燒為粉

黃耆

一兩剉

附子

一兩炮製去皮臍

鹿茸

一兩去毛

塗酥炙

肉蓯蓉

一兩酒浸一宿刮去皺皮炙令乾

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調下二錢

桑螵蛸散

出聖惠方

治膀胱虛冷小便滑數色如泔澀

桑螵蛸

一兩微炒

赤石脂

二兩

補骨脂

二兩微炒

狗脊

三分

草薢

一兩 白龍骨 二兩 韭子 三分 鹿茸 二兩 肉蓯蓉 四兩
微炒 塗酥炙

酒浸一宿 去皺皮炙 兔絲子 三兩 酒浸三日 曝乾別杵為末

右件藥搗細羅為散每服食前以溫酒調下二錢

乾地黄散

出千金方

治膀胱虛冷小便數漏精稠厚如米

白泔

乾地黄

焙三分

赤雄雞腸

兩具

雞臍胫

兩具

桑螵蛸

炒

牡

蠣

煨

龍骨

煨

黃連

去鬚各一兩

白石脂

肉蓯蓉

酒浸

焙

赤石脂

各五分

右搗篩八味雞胍脰并雞腸中密縫於甑內蒸令熟
剉碎焙乾搗羅為末每服二錢七溫酒調下

磁石散 治膀胱虛冷飢不欲食面色痿黑腰脇疼痛

磁石

二兩搗碎水淘去赤汁

黃耆

一兩

杜仲

去粗皮炙微黃

白石英

二兩

細研入

白茯苓

一兩

白朮

一兩

當歸

剉微炒

沉香

一兩

右件藥搗篩為散每服五錢以水一大盞入生薑半分棗五枚煎至五分去滓食前溫服

沉香散

出聖惠方

治膀胱虛冷氣攻腰間及腹脇疼痛

沉香

一兩

木香

三分

桃仁

三分湯浸去皮尖雙仁者麩炒微黃

葶澄茄

三分

桂心

三分

附子

一兩炮裂去皮臍

懷香子

三分

白茯苓

三分微炒

榔

一兩

右為散每服二錢食前生薑熱酒調下

拔蒜散

治膀胱虛冷小便滑數其色白濁

拔蒜

二兩

土瓜根

一兩

黃耆

一兩

白龍骨

一兩煨

牡蠣

二兩煨粉

附子

炮裂去皮臍

沉香

各一兩

五味子

肉苁蓉

酒浸刮去皮微

焙各

一兩

右為散每服四錢以水一盞煎至六分去滓食前溫

服

雞肫散

出聖惠方

治膀胱虛冷小便滑數漏精白濁如

泔

雞肫

一具微炒

乾地黄

一兩兩牡蠣

一兩煨成粉

白龍骨

一兩煨

鹿茸

一兩去毛酥炙

黃耆

三分

赤石脂

桑螵蛸

三分微炒

肉苁蓉

蓉

一兩酒浸一宿刮去皺皮炙令乾

右件為散用丹雄雞腸三具內散在腸中縫繫了於

甑內蒸之煮久取出焙乾搗篩為散每服食前以溫

酒調下二錢

肉蓯蓉丸

出聖惠方

治膀胱虛冷小便滑數白濁夢中失

精

肉蓯蓉

二兩酒浸一宿刮去皺皮炙令乾

鹿茸

二兩去毛塗酥炙微黃

白龍

骨

二兩煨過

澤瀉

一兩

附子

二兩去皮臍炮製

補骨脂

二兩微炒

山茱

萸

一兩

椒紅

二兩微炒出汗

兔絲子

一兩酒浸三宿曝乾為末

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食

前以溫酒下三十丸

牡蠣丸

出聖惠方

治膀胱虛冷腎氣衰微小便滑數白濁

牡蠣

二兩煨為粉

附子

一兩炮去皮臍

狗脊

一兩

白龍骨

二兩煨過

椒

紅

一兩微炒

澤瀉

一兩

韭子

一兩微炒

鹿茸

二兩去毛塗酥炙

肉蓯蓉

二兩酒浸一宿刮去皺皮炙令乾

右為末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子大每服食

前以溫酒下三十丸

石斛湯

治膀胱虛冷小便頻腰腹痛

石斛去根附子

炮去皮臍

五味子

澤瀉

黃耆

茯苓

酒浸切焙

白茯苓

去黑皮

人參

各一兩

檳榔

右剉如麻豆大每服五錢水一盞半煎至八分去滓

食前溫服

懷香子丸

出聖惠方

治膀胱虛冷氣攻腸脇脹滿疼痛

懷香子

一兩

木香

一兩

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁者麩炒

附子

一兩炮去

皮桂心

一兩

安息香

一兩

葫蘆巴

半兩

青皮

半兩湯浸去白瓢微炒

右為細末以酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服不拘

時熱生薑湯酒下三二十丸

五味子丸

治膀胱虛冷小便頻數

五味子

磁石

煨酒淬七遍

杜仲

去粗皮炙

附子

炮製去皮臍各一兩

木香

半兩

龍骨

半兩

藁香子

炒

青橘皮

湯浸去白炒各一兩

右為末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸溫

酒下

兔絲子散

治膀胱及腎臟虛冷憊傷小便滑數不止

兔絲子

三兩酒浸三日焙乾另杵

鹿茸

一兩去毛塗酥炙令微黃

肉苁蓉

一兩

酒浸一宿
去皺皮炙

桑螵蛸

一兩
微炒

牡蠣

一兩
煨
為粉

五味子

一兩
雞

胝脰

二兩
微炒

右搗為散每服食前以酒下二錢

萆澄茄散

治膀胱經虛小便不禁小腹冷痛

萆澄茄

木香

沉香

桂皮

去粗皮
各半兩

懷香子

炒

分兔絲子

酒浸一宿
另搗

白茯苓

去黑皮
各一兩

右為散每服二錢溫酒或鹽湯調下

補浮湯

治膀胱虛冷脚筋急腹痛引腰背不可屈伸

耳聾目眩坐欲倒小便數遺白黑如灰飢不欲飲食

黃耆

白茯苓

各一兩

杜仲

去皮薑汁炒斷絲

磁石

煨淨

白朮

五味子

各三兩

白石英

槌碎二兩半

右為散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前空

心溫服

鹿茸丸

治膀胱虛小便冷滑小腹虛脹背相引疼痛

遺精

鹿茸

去毛酥炙

肉蓯蓉

酒浸切焙

石斛

去根

懷香子

炒各一兩

龍骨

煨鍾乳粉

各半兩

右研為末酒煮糊丸梧桐子大每服三十九溫酒下空心食前服

補骨脂散 治膀胱久虛便洩不禁腹脇虛滿小腹疔痛

補骨脂

炒

懷香子

炒

葫蘆巴

炒

各一兩

檳榔

剉半兩

青橘

皮

去白炒三分

沉香

剉半兩

右為散每服二錢七溫酒或鹽湯下

鍾乳丸

治膀胱虛冷小便利多小腹冷痛脚筋拘急

鍾乳粉

沉香

桑螵蛸

炙各一兩

白茯苓

去黑皮半兩

龍

骨

煨用半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九空心食

前溫酒下

沉香丸

治膀胱久冷滯氣兼壯元氣

沉香 木香

舶上茴香

微炒

烏藥

兔絲子

酒浸三日

研爛

金鈴子

每箇剉為八片去殼巴豆三粒麩炒熟去巴豆不用以上各半兩

桃仁

一兩銀器中燒

香去皮半兩研

右七味為細末酒糊丸如梧子大每服十九至十五
丸空心溫酒或鹽湯下初服三日覺小便多或下泄
為驗

治膀胱氣虛非時氣痛往往衝心小便頻數

舶上茴香 續斷 草薢 芎藭 桂心 蓬莪

茂 京三稜 吳茱萸

各二銖

右細杵為末每服二錢七水一盞入鹽煎八分空心

服

治膀胱與腎臟皆冷腰膝沉重小便如米泔

巴戟

去心

舶上茴香

狗脊

去毛

茯苓

官桂

續斷

益智仁 萆薢

牡蠣

火煨

石斛

葫蘆巴

細

辛 芎藭 木香

各一兩

吳茱萸

三銖

右散杵羅為末煉蜜丸如梧桐子大早朝鹽湯下四

十九

逐寒散 治膀胱癰硬下部痒痛陰汗不止

蛇床子

一兩

藁本

一兩

山茱萸

一兩

防風

半兩

右件咬咀每服用稱半兩以水五盞同煎五七沸放

溫去滓淋洗

療膀胱急水腹滿身盡黃額上黑及足下熱因作黑痺
大便必黑腹臃脹滿如水狀大便溏者女勞得之非水
也腹滿者難療硝石礬石散主之

硝石熬黃礬石燒令汁盡二物等分合袂絹篩大麥
粥汁和服方寸匕日三重衣通取為汗病隨大小便

去小便正黃大便正黑也大麥用無皮者千金方硝石礬各用二分

脬轉論

夫脬轉者是脬屈僻小便不通名為脬轉其病狀臍下急痛小水不通是也此病或由小便應下勉強忍之或為寒熱所迫此二者具令水氣還上氣迫於脬中屈僻不得充暢外水應入不得其入內洩應出不得其出至外內相壅塞故令不通也此病至四五日乃有致死者

飽食訖應小便而忍之或飽食訖而走馬或小便急因疾走或忍尿入房亦皆令脬轉或脬落皆致於死矣

通治方

三十四方
法一道

石葦湯

一名鬼
箭散

治脬轉小便不通

石葦

去毛
一兩

榆白皮

剉一
升

鬼箭羽

二
兩

滑石

碎四
兩

葵子

木通

一方作
通草

甘草

炙各
三兩

右粗搗每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服一方無甘草有瞿麥

滑石湯 治脬轉小便不通

滑石

碎一兩

亂髮

燒灰

鯉魚齒

雀糞

各一兩

琥珀

半兩

硝分一

石粗搗每服三錢七水一盞煎至七分去滓不拘時
溫服

滑石散

治脬為熱所近或忍小便具令氣迫歸胞屈

僻不得充暢外水應入不得入內洩應出不得出致
小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石

二兩

白滑石

一兩

葵子

一合

亂髮灰

車前子

木通

去皮節
各一兩

右剉散水一斗煮取五升時服一升即利

琥珀湯

治腠轉小便不利煩悶

琥珀

大黃

剉炒

滑石

碎一兩

車前子

車前葉

各一兩

右麤搗每服二錢七水一盞葱白半分拍碎煎至七

分去滓溫服不拘時

通草湯

治腠轉不得小便

雀糞

半合

車前子

滑石

各四兩

通草

一作木通

芍藥

各二兩

右以咀以水七升煮取三升服五合日三先食前得立愈

琥珀湯

治脬轉臍下急滿或因霍亂而得

琥珀

研一兩

阿膠

炙燥半兩別搗

葱白

切二七莖

車前子

三兩

右先用水五盞煎葱並車前子至三盞濾去滓次下

膠末候消次又下琥珀末煎過分作三服不拘時候

溫服

治脬轉不得小便

川大黃

一兩
剉炒

琥珀

一兩
細研

車前葉

二兩

右為散每服四錢水一中盞入葱白三莖煎至六分
去滓不拘時溫服

又方

亂髮

燒灰
三兩

滑石

二兩

川芒硝

右細研令勻用白皮桃一箇搗以水絞取汁二升不
拘時以汁一小盞調下二錢

芍藥湯 治脬轉小便不利

赤芍藥 車前葉 木通

各一兩

右細剉每服五錢七水一盞半煎至一盞去滓溫服
滑石湯 治脬轉小便不通八九日丈夫婦人皆治

滑石

碎一兩

寒水石

碎一兩一方用石膏

冬葵子

半兩

右粗篩搗每服五錢七水一盞半煎八分去滓食前
溫服

葱白湯 治膀胱小便卒暴不通小腹脹急氣上衝心

悶絕欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱
閉而不通流氣衝脬系不止

陳皮

三兩

葵子

一兩

葱白

二莖

右剉散水五升煮取二升分三服

洗方 治脬轉小便不通先用

良薑

葱頭

紫蘇葉

各一握

右煎湯密室內薰洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿
洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐脚自舒其氣次

用

蜀葵子

二錢半

赤茯苓

赤芍藥

白芍藥

各半兩

右剉散每服三錢煎取清汁再暖乘熱蘇合香三丸并青鹽一錢食前溫服

蒲黃散 治膀胱不得小便經三日困篤欲死

蒲黃

滑石

各一兩

右搗羅為散每服二錢匕雞子清調下一方用溫酒調服一方用水

治噤轉欲死及失溺方

吸芥真琥珀一兩葱白十四莖

右取豆醬清和竈突中黑如豆大內陰孔中立愈

治噤轉不得小便方

右以水四升煮取三升入葱白琥珀末溫服一升日

三服大利

亂髮散 治忍小便不時起便噤轉大小便不得四五

日困篤欲死無脉服此瘥

滑石

二兩 亂髮

三兩 燒灰

右二味搗篩取生桃白皮一斤熟煮以水合絞得汁
二升以汁服散方寸七日三服即愈但淋者取亂髮
三兩燒灰滑石五兩合搗為散服方寸七一方有鯉
魚齒一兩無桃白皮

治脬轉不得小便

雞子一枚去白取黃以溫水調服之不過三服

秦芫湯 治脬轉不得小便

秦艽

不拘多少
去苗土

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞去滓溫服

車前飲 治脬轉不得小便急卒

車前草

一握去
根洗剉

右以水三盞煎至二盞去滓分三服連併服不拘時
一方用子一升水一斗煮取四升分四服

治飽食後或忍小便或走馬忍小便或大走及入房皆
致轉脬臍下急滿不通治之用以亂頭髮急纏絞如

拳火燒為末醋四合二方寸匕服之訖即炒黑豆葉
蹲坐上

治脬轉小便不得

用阿膠三兩水二升煮七合頓服

又方

用豉五合以水三升煮數沸頓服之

又方

用連枷關燒灰水服之

又方

用筆頭燒灰服之

又方

燒死蠅蝗二枚末水服之

又方

內白魚子莖孔中

又方

用酒和猪脂雞子大頓服之

又方

用麻子煮取汁頓服之

治脬轉小便不能通

用炒鹽半斤囊盛熨小腹

治忍小便脬轉

用爪甲燒灰水服之

治小便久致脬轉

取杻土塵三指撮以水服之

治小便久致脬轉

以蒲黃裹腰背令頭至地三度通一方取蒲黃服

方寸七日三服良

治卒小便不通及脬轉方


炙桑螵蛸搗為末米飲服之方寸七日三服良

治脬轉不得小便

用蒲席捲人倒立令頭至地三反則通

脬囊治法

凡尿不在脬中為脬屈僻津液不通以葱葉除尖頭內陰莖孔中深三寸微用口吹之脬順津液大通即愈



普濟方卷四十二